



胸管病人之護理指導

11209 審閱

- 一、活動前須注意管路是否有滑脫、曲折情況，並確認胸管所有連接處緊密接合，以維持密閉的引流系統。
- 二、保持胸瓶低於胸腔 60-90 公分以下，以免造成血水逆流情況發生。
- 三、多鼓勵病人下床活動、深呼吸咳嗽，促進肺部擴張及減少術後合併症發生。
- 四、觀察引流瓶中液面浮動，如吸氣時水面上升，呼氣時水面下降。
- 五、協助換藥前後要洗手，執行無菌換藥技術，觀察傷口有無局部紅、腫、熱、痛、分泌物情況。
- 六、注意病人呼吸型態，如有呼吸喘、呼吸困難、胸悶、胸痛、冒冷汗等情形，請務必告知護理人員。
- 七、勿將胸瓶內的血水倒掉。
- 八、若有胸管滑脫或胸瓶翻倒情形，需先將胸管以胸管夾夾住後，再告知護理人員，非必要勿使用止血夾夾住，避免引流阻塞。
- 九、放下床欄時須先注意會不會壓到胸瓶，避免壓迫胸瓶導致氣胸。
- 十、當咳嗽或用力時，可先用手掌壓住插管處傷口，以減輕傷口處疼痛。

祝您早日康復

※急診諮詢電話：04-23934191 轉 525434

國軍臺中總醫院急診室 關心您